

Generel vejledning til operation i lokalbedøvelse

Før operationen

HVIS De har pacemaker, er i behandling med blodfortyndende medicin (fx Magnyl eller Marevan) eller midler mod depression, skal dette oplyses i god tid før operationen.

Undlad at smøre creme på huden. Eventuelt hår fjernes dagen før med en barbermaskine i et område omkring operationsstedet.

Operationen

Huden desinficeres med klorhexidinsprit. Lokalbedøvelsen sprøjtes ind under huden med en tynd nål, det svier og spænder ca. 1 minut. Man kan ved operationen ofte mærke berøring, men ikke smerte. Såret lukkes med en tråd, der oftest skal fjernes efter 7-14 dage hos Deres praktiserende læge.

Efter operationen

Mod smerter: Lokalbedøvelsen holder i 2-6 timer.

Med mindre andet er aftalt, kan der mod smerte tages almindelige håndkøbspræparater Paracetamol, Kodimagnyl, eller evt. Ibuprofen).

Forbinding: Forbindingen fjernes efter 3 dage (med mindre andet er aftalt).

Ved behov kan såret derefter dækkes med Micropore (købes på apoteket).

Efter trådfjernelse anbefales det i 3 uger at have Micropore (papirplaster) på såret for at undgå, at kanterne skrider fra hinanden.

Restriktioner: Med mindre andet er aftalt, er der ingen restriktioner i, hvad man må, dog frarådes karbad og badning i svømmehal og havvand, indtil trådene er fjernet

Komplikationer

I sjældne tilfælde kommer der blodansamling, som oftest forsvinder af sig selv efter nogle dage til uger. I yderst sjældne tilfælde kommer der betændelse.

I meget sjældne tilfælde bliver ar grimme eller fortykkede.

I yderst sjældne tilfælde udvikles en overfølsomheds reaktion mod lokalbedøvelse, dette kræver hurtig behandling eller eventuel indlæggelse på hospital.

Søg læge: Ved større blødning, blodansamling eller tegn på betændelse (rødme, varme, hævelse, temperatur over 38,5) kontaktes klinikken, vagtlæge eller skadestue.